

수입의약품

# 타리비드® 점안액

(오픈룩사신)

Tarivid® ophthalmic solution **Santen**

전문의약품

### ■ 원료약품 및 분량

이 약 1mL 중  
유효성분 : 오픈룩사신(JP) ----- 3mg  
첨가제 : 염화나트륨, 묽은염산, 수산화나트륨, 정제수

■ **성상** : 이 약은 미황색~담황색의 등명한 점안액입니다.

### ■ 효능·효과

(유효균종)  
본제 감수성의 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 소구균속, 모락셀라속, 간균속, 클렙시엘라속, 세라치아속, 프로테우스속, 모르가넬라 모르가니, 프로비덴시아속, 헬코균속(인플루엔자균, 헤모필루스 애칭티우스 (Koch-Weeks bacillus), 슈도모나스속, 녹농균, 박출데리아 세피시스, 스테노트로포모나스(산토모나스)말도필리아, 아시네토박터속, 프로피오나테리움에이크네스  
(적응중)  
안검염, 누낭염, 맥립종, 결막염, 검편선염, 각막염(각막궤양을 포함), 안과 수술 전후의 무균화 요법

### ■ 용법·용량

1회 1방울 1일 3회 점안(도포)합니다.  
증상에 따라 적절히 증감합니다.  
수술후감염증 : 수술전 2일간 1일 5회 점안, 수술 당일에는 수술의 시각, 수술의 종류에 따라 적의 점안하고 수술 직후에 1회 점안, 이후는 포대교환시 매회 점안합니다.

### ■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.  
이 약 및 퀴놀론계 항생물질에 과민증 병력이 있는 환자
- 이상반응  
1) 속 : 드물게 속양 증생구역, 사지냉감, 호흡곤란 등이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.  
2) 과민증 : 드물게 심혈관계 허탈, 의식소실, 혈관 부종(인두, 후두, 얼굴), 기도폐쇄, 호흡곤란, 발진, 두드러기, 가려움증, 안검발적·부종, 피부발적, 결막충혈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.  
3) 눈 : 때때로 일시적인 작열감 등 자극감, 불쾌감이 때때로 자통, 발적, 소양감, 화학적 결막염 및 각막염, 안구주위 및 인면 부종, 이물감, 눈부심, 시력불선명, 눈물, 건조감, 인통, 드물게 여지러움, 비만성 표층각막염 등의 각막장애 및 독성표피괴사증까지 악화되는 스티븐스-존슨 증후군이 일어날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하십시오.  
4) 기타 : 청각장애, 때때로 자극증상이 일어나는 경우가 있습니다.
- 일반적 주의  
1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하십시오.  
2) 이 약의 장기 사용은 잔균을 비롯한 비감수성균의 과잉 성장을 초래할 수 있으므로 장기 사용 하지 마십시오. 중복 감염시 투여를 중지하고 다른 요법으로 대처하십시오.
- 임부 및 수유부에 대한 투여  
1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.  
2) 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중단하거나 이 약의 투여를 중지하십시오.
- 소아에 대한 투여  
1세 미만의 영아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.
- 적응상의 주의  
1) 점안용으로만 사용하십시오.  
2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.  
3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항  
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.  
3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **포장단위** : 5mL/병

■ **사용기한** : 본 제품의 사용기한은 직접용기 혹은 외부포장에 기재되어 있습니다.

- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 이 첨부문서 작성일자 이후 개정된 내용은 홈페이지(www.santen.co.kr)나 전화로 문의하시면 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

제조원

**SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

Noto plant : 2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan

제휴원



**DAIICHI SANKYO CO., LTD.**

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

수입판매원

**한국산텐제약(주)**

TR · KRS

서울 강남구 테헤란로 203, 15층 (역삼동, 에스아이타워) (TEL : 1522-1430)

04

※ 첨부문서작성일 : 2019년 12월 1일